



### **Verdere oefeningen**

Verdere oefeningen zijn nuttig en noodzakelijk om enerzijds de soepelheid van het heupgewricht te onderhouden en anderzijds de kracht van de heupspijeren te versterken. Dit gebeurt bij voorkeur onder toezicht van een kinesist van uw keuze. Het voorschrift voor de kinesist bevindt zich onderaan het blauwe blad dat u meekrijgt op de raadpleging: mobilisatie, gedoseerde spieroefeningen en verdere gangreëducatie. Op deze manier herwint u van dag tot dag meer zelfstandigheid, zodat stappen met één kruk en zonder kruk mogelijk wordt.

Onthou echter dat overhaasting volkomen verkeerd is: het lichaam zal zich geleidelijk aan uw kunstheup aanpassen.

Het voorschrift voor de kinesist is zeer belangrijk: géén massage op het litteken, geen straight-leg raising en géén oefeningen die pijn of overbelasting veroorzaken. Dring daarom bij uw kinesist aan

om het voorschrift strikt te volgen!

### **Bloedverdunnende spuitjes**

Bij ontslag wordt een voorschrift voor bloedverdunnende Clexane spuitjes meegegeven. Deze kunnen zelf toegediend worden of er kan een thuisverpleegkundige ingeschakeld worden. In totaal worden deze spuitjes 6 weken toegediend.

### **Verbandzorg en haakjes**

Indien de wonde droog blijft, kan het verband gerust gedurende vijf dagen gesloten blijven. Zoniet dienen er verbandwissels te gebeuren. Eventueel kan een thuisverpleegkundige hiervoor ingeschakeld worden. De haakjes mogen twee weken na de ingreep verwijderd worden door de huisarts of verpleegkundige. Hiervoor bestaat een speciaal tangetje dat het verwijderen van de haakjes volledig pijnvrij maakt.

### **Pijnmedicatie**

Bij ontslag uit het ziekenhuis is de pijn grotendeels verdwenen. Een pijnopstoot kan voorkomen en eenvoudig aangepakt worden met paracetamol onder de vorm van bruistabletten of in pilvorm (max 4X 1g per dag).

### **Te mijden posities**

De eerste twee maanden herstellen de weke delen rondom de heupprothese. Dit herstel is uiterst belangrijk voor een blijvende stabiliteit van de kunstheup. Mijdt daarom verkeerde houdingen en extreme bewegingen in die periode.

### **Verwikkelingen die thuis kunnen optreden**

Latere verwikkelingen die thuis kunnen optreden zijn even zeldzaam als de verwikkelingen in het ziekenhuis.

De vorming van bloedklonters of flebitis blijft mogelijk thuis en wordt vermeden door dagelijkse bloedverdunnende Clexane spuitjes.

Heupontwrichting of luxatie is meestal te wijten aan een verkeerde beweging.

Infectie of besmetting in een tweede tijd kan voorkomen, raadpleeg daarom bij het lekken van de wonde of bij koorts uw huisarts.

Een stijf gevoel in het been kan tijdelijk voorkomen. Overdreven krachtoefeningen zijn uit den boze.

Soms kan men na een metaal-op-metaal prothese een eigenaardig piepend geluid horen. Dit hoeft u niet ongerust te maken en verdwijnt spontaan.